

# 44-й Международный математический Турнир городов

## Предварительные решения задач весеннего тура

### Базовый вариант, 8–9 классы

1. В кабинете сидят  $N$  нерях, у каждого на его столе скопилось ненулевое количество мусора. Неряхи выходят обедать по одному (после возвращения предыдущего), а в это время каждый из остальных перекладывает половину мусора со своего стола на стол вышедшего. Может ли случиться, что после того, как все пообедали, количество мусора на столах ни у кого не изменится, если а) [1]  $N = 2$ ; б) [3]  $N = 10$ ?

Алексей Заславский

**Ответ:** может.

**Решение.** а) Подходит пример, когда у первого ушедшего 2 г мусора, а у второго – 4 г.

б) Занумеруем нерях в порядке их ухода на обед. Пусть на столе  $i$ -того неряхи лежит  $2^i$  г мусора. После ухода первого на его столе окажется  $2 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^9 = 2^{10}$  г мусора, а на остальных столах вес мусора уменьшится вдвое, то есть произойдёт циклический сдвиг. После ухода второго произойдёт аналогичный сдвиг, а после 10 таких сдвигов на всех столах окажется исходное количество мусора.

2. [4] В треугольнике  $ABC$  провели медианы  $BK$  и  $CN$ , пересекающиеся в точке  $M$ . Какое наибольшее количество сторон четырёхугольника  $ANMK$  может иметь длину 1?

Егор Бакаев

**Ответ:** 2 стороны. **Решение.** Подходит, например, любой треугольник, где  $AB = AC = 2$ .


Докажем, что трёх равных сторон быть не может.

**Способ 1.** Предположим, что хотя бы три стороны четырёхугольника  $ANMK$  равны 1. Возможны всего два принципиально различных случая.

1)  $AN = NM = MK = 1$ . Тогда  $NB = 1$ ,  $MB = 2$ , значит,  $MN + NB = MB$ .

2)  $KA = AN = NM = 1$ . Тогда  $AC = 2$ ,  $NC = 3$ , значит,  $NA + AC = NC$ .

В обоих случаях получено противоречие с неравенством треугольника.



**Способ 2.** Если более двух сторон четырёхугольника равны 1, то либо  $AK = NA$ , либо  $KM = MN$ . В первом случае  $ABC$  равнобедренный. Во втором случае  $BK = CN = 3$ , так что и в этом случае  $ABC$  равнобедренный. Отсюда следует, что  $AK = KM = MN = NA$ , то есть  $AKMN$  – ромб. Противоречие, так как прямые  $AK$  и  $NM$  не параллельны.

**Способ 3.** Пусть  $L$  – середина стороны  $BC$ . Если  $NM = NA = NB$ , то треугольник  $AMB$  прямоугольный. Треугольник  $LMK$  подобен треугольнику  $AMB$  с коэффициентом 0,5, поэтому  $MK < LK = NA$ . Далее,  $AM > LM$ , поэтому у треугольника  $AMK$  гипотенуза больше,

чем у треугольника  $LMK$ , то есть  $AK > LK = NA$ . Таким образом в четырёхугольнике  $ANMK$  нет трёх равных друг другу сторон.

Случай, когда  $KM=KA$  аналогичен, а если  $KM \neq KA$  и  $NM \neq NA$ , то среди отрезков  $NM, NA, KM, KA$  также нет трёх равных друг другу.

**Замечание.** Любые две стороны четырёхугольника  $ANMK$  могут быть равны 1. Равенство  $NM = NA$  выполнено в треугольнике с перпендикулярными медианами (см. способ 3). Равенство  $NA = MK$  выполнено в треугольнике, где  $AB = 2, BK = 3$ .

3. [5] На столе лежат 2023 игральных кубика. За 1 рубль можно выбрать любой кубик и переставить его на любую из четырёх граней, которые сейчас для него боковые. За какое наименьшее количество рублей гарантированно удастся поставить все кубики так, чтобы на верхних гранях у них было поровну точек? (Количества точек на гранях каждого игрового кубика равны числам 1, 2, 3, 4, 5, 6, суммарное число точек на противоположных гранях всегда равно 7.)

*Егор Бакаев*

**Ответ:** за 2022 рубля.

**Решение 1.** Пусть есть пара *противоположных* кубиков, то есть сумма точек на их верхних гранях равна 7. Заметим, что на эту пару потребуется суммарно 2 рубля, к какому бы значению ни захотелось их привести. Будем откладывать пары противоположных, пока они есть. Так как исходное количество кубиков нечётно, то в конце останется хотя бы один кубик. Тогда остальные непарные кубики, каждый не более чем за рубль, можем привести в состояние этого оставшегося кубика. Значит, 2022 рублей хватит.

С другой стороны, мог остаться только один кубик без пары, поэтому 2022 рубля необходимо.

**Решение 2.** Обозначим через  $k_i$  общее количество кубиков с  $i$  точками на верхней грани, а через  $n_i$  – наименьшее количество рублей, за которое можно на всех верхних гранях сделать по  $i$  точек. Тогда  $k_1 + \dots + k_6 = 2023$ , а  $n_1 = k_2 + k_3 + k_4 + k_5 + 2k_6 = 2023 + k_6 - k_1$ , и аналогично  $n_2 = 2023 + k_5 - k_2, \dots, n_6 = 2023 + k_1 - k_6$ . Тогда  $n_1 + \dots + n_6 = 6 \cdot 2023$ . Пусть среди чисел  $n_1, \dots, n_6$  нет числа, меньшего 2023. Тогда  $n_1 = \dots = n_6 = 2023$ , откуда  $k_1 = k_6, k_2 = k_5, k_3 = k_4$ , поэтому  $2023 = k_1 + k_2 + k_3 + k_4 + k_5 + k_6 = 2(k_1 + k_2 + k_3)$  – чётное, противоречие. Значит, одно из чисел  $n_1, \dots, n_6$  не превосходит 2022, то есть 2022 рублей в любом случае достаточно.

При  $k_1 = \dots = k_5 = 337, k_6 = 338$  получим  $n_1 = 2024, n_2 = \dots = n_5 = 2023, n_6 = 2022$ , то есть 2021 рубля недостаточно.

4. [5] Для произвольного числа  $x$  рассмотрим сумму

$$Q(x) = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{x}{10000} \right\rfloor.$$

Найдите разность  $Q(2023) - Q(2022)$ . (Здесь  $\lfloor x \rfloor$  обозначает целую часть числа  $x$ , то есть наибольшее целое число, не превосходящее  $x$ .)

*Алексей Толпыго*

**Ответ: 6. Решение.** Очевидно,  $\left\lfloor \frac{x-1}{k} \right\rfloor \leq \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor$ . Неравенство  $\left\lfloor \frac{x-1}{k} \right\rfloor < \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor = m$  означает, что  $x - 1 < km \leq x$ , откуда  $x = km$ , то есть  $x$  делится на  $k$ , и тогда  $\left\lfloor \frac{x-1}{k} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor - 1$ . Верно и обратное: если  $x$  кратно  $k$ , то  $\left\lfloor \frac{x-1}{k} \right\rfloor < \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor$ .

Тогда среди чисел  $[2023] - [2022], \left\lfloor \frac{2023}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{2022}{2} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{2023}{10000} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{2022}{10000} \right\rfloor$  единиц ровно столько, сколько у числа  $u$  натуральных делителей, не превосходящих  $u$ , а остальные числа равны нулю. Разность  $Q(2023) - Q(2022)$  равна сумме вышеуказанных чисел, и поэтому равна количеству натуральных делителей числа  $2023 = 7 \cdot 17^2$ , то есть 6.

**5.** На каждой клетке доски  $5 \times 5$  лежит по одной монете, все монеты внешне одинаковы. Среди них ровно 2 монеты фальшивые, они одинакового веса и легче настоящих, которые тоже весят одинаково. Фальшивые монеты лежат в клетках, имеющих ровно одну общую вершину. Можно ли за одно взвешивание на чашечных весах без гирь гарантированно найти **а)** [2] 13 настоящих монет; **б)** [3] 15 настоящих монет; **в)** [2] 17 настоящих монет?

*Рустэм Женодаров, Александр Грибалко, Сергей Токарев*

**Ответ: а) можно; б) можно; в) нельзя.**

**Решение.** Раскрасим доску и монеты на ней в шахматном порядке (угловые клетки чёрные). Отметим, что обе фальшивые монеты одного цвета.

**а) Способ 1.** Положим на весы 16 монет, лежащих на краю доски: на одну чашку – 8 чёрных, на другую – 8 белых. Возможны три случая.

1) Весы в равновесии. Так как фальшивые монеты могли быть только на одной чаше, их нет среди взвешиваемых монет, то есть, все 16 взвешиваемых монет настоящие.


2) Перевесила «чёрная» чашка. Тогда одна фальшивая монета – на «белой» чашке. Следовательно, все 13 чёрных монет настоящие.

3) Перевесила «белая» чашка. Тогда одна фальшивая монета – на «чёрной» чашке. Поэтому центральная монета настоящая. И все 12 белых монет тоже.

**Обобщение.** Отложим любую чёрную монету  $A$  и всех её соседей по диагонали. Из оставшихся чёрных монет положим на одну чашу не менее 7, а на другую -- столько же белых. При равновесии все монеты на весах настоящие (их не меньше 14). Если перевесят чёрные, то все чёрные монеты настоящие, а если белые, то все белые и  $A$ .


**Способ 2.** Положим на чаши 4 чёрные монеты, соседние с центральной, левые – на левую, правые – на правую. При равновесии все чёрные монеты настоящие (так как две фальшивые чёрные монеты не могут быть ни на разных чашах, ни обе вне чаш). Если какая-то чаша перевесит, то настоящие – две монеты на этой чаше и все белые монеты.

**б) Способ 1.** Взвесим чёрные монеты против белых на рисунке слева. В случае равновесия 15 монет в нижних трёх строках настоящие. Если чёрные монеты тяжелее, не взвешиваемая фальшивая монета может находиться только в квадратах, отмеченных крестиками на рис.



в центре. Следовательно, мы нашли  $25 - 5 - 5 = 15$  настоящих монет. Если белые монеты тяжелее, ситуация показана на рисунке справа с тем же результатом.

**Способ 2.** Взвесим чёрные монеты против белых на левом рисунке. В случае равновесия все 16 взвешиваемых монет настоящие. Если чёрные монеты тяжелее, не



взвешиваемая фальшивая монета может находиться только в двух квадратах, отмеченных крестиками на центральном рисунке. Таким образом, найдены  $25 - 8 - 2 = 15$  настоящих монет. Если белые монеты тяжелее, получим тот же результат (правый рисунок).

**Способ 3.** Из пятой строки две белые монеты положим на левую чашку, две чёрные – на правую, а одну монету отложим. Остальные белые – на правую, чёрные – на левую чашку.

При равновесии все монеты из первых трёх строк настоящие. Если какая-то чашка перевесит, то настоящие – все 12 монет на ней и все монеты из пятой строки (итого 15 монет).

в) Априори любая из 25 монет *подозрительна* (может быть фальшивой). Взвешивание может иметь 3 исхода, поэтому хотя бы при одном из них подозрительными останутся не меньше 9 монет, то есть будет найдено не более  $25 - 9 = 16$  настоящих монет.

**Замечание.** Докажем, что даже 16 настоящих монет гарантированно найти нельзя.

Рассмотрим граф: вершины – клетки, рёбра соединяют пары клеток, имеющих единственную общую вершину. Он распадается на две компоненты – чёрную и белую. Взвешивание – разбиение вершин на три части: П – монеты на правой чашке, Л – на левой, С – монеты на столе. В случае равновесия подозрительными остаются рёбра вида ЛП и СС, покрасим их в красный цвет. Если перевесит правая чашка, подозрительны рёбра ЛЛ и ЛС (покрасим их в синий), если левая – ПП и ПС (в зелёный).

Пусть при любом исходе удаётся определить 16 настоящих монет. Тогда подграф, порождённый рёбрами каждого цвета, должен содержать не более 9 вершин. Значит, есть вершины, в которых сходятся разные цвета. Пусть в белой компоненте такая вершина единственна. Удалив её со всеми входящими рёбрами, получим связный граф на 11 вершинах, который не может иметь все рёбра одного цвета. Противоречие.

Следовательно, в белой компоненте хотя бы две «нехороших» вершины. Аналогичное верно и для чёрной компоненты.

Оценим двумя способами суммарное число вершин во всех трёх указанных подграфах. С одной стороны, их не больше  $39 = 27$ , с другой – не меньше, чем  $25 + 2 + 2$  («нехорошие вершины» подсчитаны как минимум дважды). Противоречие.

## Базовый вариант, 10–11 классы

1. [4] См. задачу 3 младших классов.

2. [4] Дано натуральное число  $n$ . Для произвольного числа  $x$  рассмотрим сумму

$$Q(x) = [x] + \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{x}{10^n} \right\rfloor.$$

Найдите разность  $Q(10^n) - Q(10^n - 1)$ . (Здесь  $[x]$  обозначает целую часть числа  $x$ , то есть наибольшее целое число, не превосходящее  $x$ .)

*Алексей Толпыго*

**Ответ:**  $(n + 1)^2$ . **Решение.** Очевидно,  $\left\lfloor \frac{x-1}{k} \right\rfloor \leq \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor$ . Неравенство  $\left\lfloor \frac{x-1}{k} \right\rfloor < \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor = m$  означает, что  $x - 1 < km \leq x$ , откуда  $x = km$ , то есть  $x$  делится на  $k$ , и тогда  $\left\lfloor \frac{x-1}{k} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor - 1$ . Верно и обратное: если  $x$  кратно  $k$ , то  $\left\lfloor \frac{x-1}{k} \right\rfloor < \left\lfloor \frac{x}{k} \right\rfloor$ . Пусть  $y = 10^n$ .

Тогда среди чисел  $[y] - [y - 1]$ ,  $\left\lfloor \frac{y}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{y-1}{2} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{y}{y} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{y-1}{y} \right\rfloor$  единиц ровно столько, сколько у числа  $y$  натуральных делителей, не превосходящих  $y$ , а остальные числа равны нулю. Разность  $Q(y) - Q(y - 1)$  равна сумме вышеуказанных чисел, и значит равна количеству натуральных делителей числа  $y = 2^n \cdot 5^n$ , то есть  $(n + 1)^2$ .

3. [5] Пусть  $I$  – центр вписанной окружности треугольника  $ABC$ ,  $N$  – основание биссектрисы угла  $B$ . Касательная к описанной окружности треугольника  $AIN$  в вершине  $A$  и касательная к описанной окружности треугольника  $CIN$  в вершине  $C$  пересекаются в точке  $D$ . Докажите, что прямые  $AC$  и  $DI$  перпендикулярны.

*Михаил Евдокимов*

**Решение 1.** Рассмотрим центр  $J$  внеписанной окружности треугольника  $ABC$ , касающейся стороны  $AC$ . Поскольку  $\angle IAJ = \angle ICJ = 90^\circ$  (биссектрисы смежных углов перпендикулярны), точки  $A$  и  $C$  лежат на окружности  $\omega$  с диаметром  $IJ$ . По условию  $\angle ACD = \angle NCD = \angle CIN = \angle CIJ = \angle CAJ$ , аналогично  $\angle CAD = \angle ACJ$ . Значит, треугольники  $ACD$  и  $CAJ$  симметричны относительно серединного перпендикуляра к общей стороне  $AC$ . Если точки  $D$  и  $J$  совпадают, то треугольники  $IAJ$  и  $ICJ$  равны по катету и гипотенузе. Значит, прямая  $ID = IJ$  совпадает с указанным серединным перпендикуляром. Если они не совпадают, точка  $D$  также лежит на  $\omega$  и  $DI \perp DJ \parallel AC$ .

**Решение 2.** Пусть перпендикуляр, опущенный из  $I$  на  $AC$  вторично пересекает описанную окружность треугольника  $AIC$  в точке  $D'$ . Тогда

$$\angle D'AC = \angle D'IC = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle C = \frac{1}{2} (\angle A + \angle B) = \angle AIN.$$

Значит,  $D'A$  – касательная к описанной окружности треугольника  $AIN$ . Аналогично  $D'C$  – касательная к описанную окружности треугольника  $CIN$ . Следовательно,  $D$  и  $D'$  совпадают.

**Решение 3.** Нетрудно понять, что точки  $I$  и  $D$  лежат по разные стороны от прямой  $AC$ . Поскольку  $\angle ACD = \angle NCD = \angle CIN$ ,  $\angle CAD = \angle AIN$ , то

$$\angle ADC = 180^\circ - \angle ACD - \angle CAD = 180^\circ - \angle AIC.$$

Значит, четырёхугольник  $AICD$  вписан. Один из углов между хордами  $AC$  и  $DI$  равен

$$\angle DAC + \angle ADI = \angle AIN + \angle ACI = \angle IAB + \angle ABI + \angle ACI = \frac{1}{2}(\angle A + \angle B + \angle C) = 90^\circ.$$

4. [5] Бесконечные возрастающие арифметические прогрессии  $a_1, a_2, a_3, \dots$  и  $b_1, b_2, b_3, \dots$  состоят из положительных чисел. Известно, что отношение  $\frac{a_k}{b_k}$  целое при любом  $k$ . Верно ли, что это отношение не зависит от  $k$ ?

Борис Френкин

**Ответ:** верно.

**Решение 1.** Пусть  $a_k = a + ck$ ,  $b_k = b + dk$ . Тогда  $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \frac{c}{d}$ . Но целочисленная последовательность может иметь пределом только целое число, причём все её члены с какого-то момента должны совпадать с этим пределом. Значит,  $m = \frac{c}{d}$  – целое число и

$\frac{a + ck}{b + dk} = \frac{c}{d}$  при всех достаточно больших  $k$ . Но тогда  $ad = bc$ , то есть  $a = bm$ , и поскольку

$c = dm$ , получаем, что  $\frac{a_k}{b_k} = m$  при всех  $k$ .

**Решение 2.** Для положительных чисел  $p, q, r, s$  воспользуемся следующим фактом: если  $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ , то  $\frac{p}{q} < \frac{p+r}{q+s} < \frac{r}{s}$  (легко проверить). Используем обозначения решения 1.

Доопределим  $a_0 = a$ ,  $b_0 = b$ . Предположим, что  $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ . Докажем индукцией по  $k \geq 0$ , что

$\frac{a_k}{b_k} < \frac{a_{k+1}}{b_{k+1}} < \frac{c}{d}$ . База  $k=0$  получается применением указанного факта к неравенству  $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ , а

переход от  $k$  к  $k+1$  – применением факта к неравенству  $\frac{a_{k+1}}{b_{k+1}} < \frac{c}{d}$ . Тогда

последовательность  $\frac{a_k}{b_k}$  целых чисел возрастает, оставаясь ограниченной сверху.

Противоречие. Аналогично к противоречию ведёт предположение  $\frac{a}{b} > \frac{c}{d}$ . Значит,  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ,

а тогда и  $\frac{a_k}{b_k} = \frac{c}{d}$ .

5. Даны пять точек, расстояние между любыми двумя из них больше 2. Верно ли, что расстояние между какими-то двумя из них больше 3, если эти 5 точек расположены

а) [3] на плоскости;

б) [3] в пространстве?

Алексей Толпыго

а) **Ответ:** верно.

**Решение 1. Лемма.** Если в треугольнике две стороны больше 2, а угол между ними больше  $105^\circ$ , то длина третьей стороны больше 3.

**Доказательство.** Заметим, что  $\sin 15^\circ = \frac{\sin 30^\circ}{2 \cos 15^\circ} > \frac{\sin 30^\circ}{2} = \frac{1}{4}$ . По теореме косинусов

квадрат третьей стороны больше  $2^2 + 2^2 - 8 \cos 105^\circ = 8 + 8 \sin 15^\circ > 10 > 3^2$ .  $\square$

Рассмотрим два случая.

1) Выпуклая оболочка данных пяти точек – пятиугольник  $ABCDE$ . Тогда один из его углов (пусть  $B$ ) не меньше  $3 \cdot 180^\circ : 5 = 108^\circ$ . По лемме  $AC > 3$ .

2) Выпуклая оболочка – четырёхугольник или треугольник. Тогда одна из точек (пусть  $D$ ) принадлежит одному из треугольников (пусть  $ABC$ ), образованному тремя другими точками. В этом случае один из углов  $ADB$ ,  $ADC$ ,  $BDC$  не меньше  $120^\circ$ . По лемме сторона треугольника, на которую он опирается, больше 3.

**Замечания.** 1. Случай, когда выпуклая оболочка – отрезок, очевиден.

2. Аналогичные рассуждения доказывают, что найдутся даже точки на расстоянии, большем  $1 + \sqrt{5}$ . Улучшить этот результат нельзя, что доказывает пример правильного пятиугольника.

б) **Ответ.** Неверно. *Пример.* Рассмотрим пять вершин правильной

четырёхугольной пирамиды с равными рёбрами и диагональю основания длины 3. Тогда

длины всех рёбер равны  $\frac{3}{\sqrt{2}} > 2$ . Можно даже взять 6 точек – в вершинах правильного

октаэдра, или в вершинах правильной треугольной призмы с равными рёбрами, у которой диагональ боковой грани равна 3.

**Замечание 1.** В условиях задачи в пространстве можно показать, что расстояние между

какими-то двумя точками больше  $4\sqrt{\frac{3}{7}} \approx 2,6186$ . Этот результат нельзя улучшить, что

показывает следующий пример.

Рассмотрим правильную треугольную пирамиду со стороной основания 3 и высотой 1,5.

Её боковое ребро равно  $\sqrt{3 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{21}}{2} > 2$ . Склеив две такие пирамиды основаниями,

получим бипирамиду (5 вершин), у которой отношение наибольшего расстояния между

вершинами к наименьшему как раз равно  $2\sqrt{\frac{3}{7}}$ .